

FRONTLINE®

TRI-ACT® PARA PERROS



MATA PULGAS, GARRAPATAS Y AL MOSQUITO TRANSMISOR DE LA LEISHMANIOSIS

DÉJALE DISFRUTAR, DEL RESTO SE ENCARGA FRONTLINE



EFICAZ CONTRA:



PULGAS



GARRAPATAS



MOSQUITOS



FLEBOTOMOS



MOSCA DE LOS ESTABLOS

Frontline® Tri-Act solución spot-on para perros. **Composición:** Cada ml contiene: Fipronilo 67,6 mg; Permetrina 504,8 mg. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas *Ctenocephalides felis* y prevención de las infestaciones por pulgas *Ctenocephalides canis*. Un tratamiento previene una nueva infestación por pulgas durante 4 semanas. Puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Tratamiento y prevención de las infestaciones por garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Un tratamiento mata las garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*), repele las garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) durante 4 semanas después del tratamiento y repele las garrapatas *Dermacentor reticulatus* desde los 7 días hasta las 4 semanas después del tratamiento. Repele (actividad antialimentación) flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*) durante 3 semanas y mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) durante 4 semanas. Mata flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*) y mosquitos (*Aedes albopictus*) durante 3 semanas. Repele (actividad antialimentación) y mata la mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*) durante 5 semanas. **Contraindicaciones:** No usar en animales enfermos o convalecientes. No usar en gatos ni en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Posología y administración:** La dosis mínima recomendada es de 6,76 mg de fipronilo / kg de peso corporal, y 50,48 mg de permetrina / kg de peso corporal, equivalente a 0,1 ml de solución spot-on por kg de peso corporal. Seleccionar el tamaño de pipeta apropiado para el peso del perro. El medicamento debería ser aplicado en dos puntos fuera del alcance del animal de manera que éste no pueda lamerlos. **Precauciones:** No está recomendado en perros menores de 8 semanas de edad ni de menos de 2 kg de peso. Evitar el contacto con los ojos del perro. Es importante asegurarse de que se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que otros animales no laman la zona de aplicación después del tratamiento. **Reacciones adversas:** En muy raras ocasiones se han observado reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de pelo. También se ha observado salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad incrementada a la estimulación, hiperactividad, temblor muscular, depresión, otros signos nerviosos) o vómito. En caso de lamido de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis. **Tiempo de espera:** No procede. **Conservación:** Conservar en el blíster original. **Presentación:** 1, 3 o 6 pipetas. **Nº autorización:** 3089 - 3093 ESP. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

www.frontlinemascotas.es

**Boehringer
Ingelheim**